

消炎鎮痛インドメタシンパップS

(ショウエンチンツウインドメタシンパップエス)

区分	第2類医薬品					
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ●有効成分のインドメタシンが痛みの原因物質の生成を抑え、痛みを鎮める冷感タイプのパップ剤です。 ●粘着性にすぐれた基剤と伸縮性のある基布を使用していますので、ひじやひざにもピッタリフィットします。 ●基剤中の水分により、打撲、ねんざ等による熱をもった患部を心地よく冷却します。 					
成分／含量	膏体100g(1,000cm ²)中 インドメタシン 0.5g 添加物として、マクロゴール、トメントール、酸化チタン、エデト酸Na、D-ソルビトール、ポリアクリル酸部分中和物、CMC-Na、グリセリン、香料、pH調整剤、その他3成分を含有する。					
効能または効果	腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫					
用法／用量	ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。 <ul style="list-style-type: none"> ●15歳未満の小児は使用しないこと。 <用法及び用量に関連する注意> (1)用法・用量を厳守すること。 (2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であるので、症状がある場合だけ使用すること。 (3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。 (4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。					
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ●してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 1.次の人は使用しないこと <ol style="list-style-type: none"> (1)本剤又は本剤の成分により過敏症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。 (2)ぜんそくを起こしたことがある人。 (3)15歳未満の小児。 2.次の部位には使用しないこと <ol style="list-style-type: none"> (1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。 (3)みずむし、たむし等又は化膿している患部。 3.連続して2週間以上使用しないこと ●相談すること <ol style="list-style-type: none"> 1.次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること <ol style="list-style-type: none"> (1)医師の治療を受けている人。 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">関係部位</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること 		関係部位	症状	皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血
関係部位	症状					
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血					
保管及び取り扱い上の注意	(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。 (2)小児の手の届かない所に保管すること。 (3)他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。) (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用すること。(品質保持のため)					
製造販売元	帝國製薬株式会社 香川県東かがわ市三本松567番地					
お問い合わせ先	帝國製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0879-25-2363 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)					