

消炎鎮痛フェルビナクプラスターS

(ショウエンチンツウフェルビナクプラスターエス)

区分	第2類医薬品		
特徴	<ul style="list-style-type: none"> ● 抗炎症・鎮痛成分フェルビナクを5.0%配合したプラスター剤です。 ● ビタミンE(トコフェロール酢酸エステル)が末梢の血行を促進し、さらにメントールの働きで心地よい冷感刺激があり、痛みをやわらげます。 ● 目立ちにくい肌色で伸縮性のある基布を使用しています。 		
成分/含量	膏体100g中 フェルビナク 5.0g トメントール 3.0g トコフェロール酢酸エステル 2.3g 添加物として、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、脂環族飽和炭化水素樹脂、流動パラフィン、ジブチルヒドロキシトルエン(BHT)、その他2成分を含有します。		
効能または効果	肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みと腫れ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫		
用法/用量	<用法・用量>		
	年齢	使用方法	
	15歳以上	表面のライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。	
	15歳未満	使用しないでください。	
	<用法・用量に関連する注意> (1)用法・用量を厳守してください。 (2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であるので、症状がある場合だけ使用してください。 (3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。 (4)皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。		
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none"> ● してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。) 1.次の人は使用しないでください。 (1)本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。 (2)ぜんそくを起こしたことがある人。 (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (4)15歳未満の小児。 2.次の部位には使用しないでください。 (1)目の周囲、粘膜等。 (2)湿疹、かぶれ、傷口。 (3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。 3.連続して2週間以上使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ● 相談すること 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。 (1)医師の治療を受けている人。 (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。		
	関係部位	症状	
	皮膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ、水疱等	
	まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。		
	症状の名称	症状	
	ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。	
	3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。		
	保管及び取り扱い上の注意	(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。	
		(2)小児の手の届かない所に保管してください。	
		(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)	
(4)品質保持のため、開封後の未使用分はもとの袋に入れ、開封部を折り曲げ、きちんと閉めて保管してください。			
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべく早く使用してください。			
製造販売元	帝國製薬株式会社 香川県東かがわ市三本松567番地		
お問い合わせ先	帝國製薬株式会社 お客様相談室 TEL 0879-25-2363 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)		