

# 消炎鎮痛冷感パップA

(ショウエンチンツウレイカンパップエー)

| <b>区分</b>           | 第3類医薬品  |      |    |    |           |
|---------------------|---|------|----|----|-----------|
| <b>特徴</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●消炎鎮痛効果と冷湿布作用をあわせもったパップ剤です。</li> <li>●3種の有効成分(サリチル酸メチル、l-メントール、dl-カンフル)の働きで、筋肉痛、ねんざ、打ち身などによく効きます。</li> <li>●粘着性にすぐれた基剤と伸縮性にすぐれた基布を使用していますので、ピッタリフィットします。</li> </ul>  |      |    |    |           |
| <b>成分/含量</b>        | <p>膏体100g(1000cm<sup>2</sup>)中</p> <p>サリチル酸メチル 0.5g、dl-カンフル 0.5g、l-メントール 0.3g</p> <p>添加物として、CMC-Na、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、エデト酸Na、酸化チタン、pH調整剤、その他3成分を含有する。</p>   |      |    |    |           |
| <b>効能または効果</b>      | 腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ  |      |    |    |           |
| <b>用法/用量</b>        | <p>&lt;用法・用量&gt;</p> <p>表面のライナーをはがし、患部に1日1～2回貼付する。</p> <p>&lt;用法・用量に関連する注意&gt;</p> <p>(1)用法・用量を厳守すること。</p> <p>(2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。</p> <p>(3)汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用すること。</p> <p>(4)皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないこと。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用すること。)</p>   |      |    |    |           |
| <b>使用上の注意</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>●してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)</li> <li>次の部位には使用しないこと</li> <li>(1)目の周囲、粘膜等。</li> <li>(2)湿疹、かぶれ、傷口。</li> <li>●相談すること</li> <li>1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</li> <li>薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。</li> <li>2.使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">関係部位</th> <th>症状</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>皮膚</td> <td>発疹・発赤、かゆみ</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること</p> | 関係部位 | 症状 | 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 関係部位                | 症状  |      |    |    |           |
| 皮膚                  | 発疹・発赤、かゆみ   |      |    |    |           |
| <b>保管及び取り扱い上の注意</b> | <p>(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。</p> <p>(2)小児の手の届かない所に保管すること。</p> <p>(3)他の容器に入れ替えないこと。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管すること。(誤用の原因になったり品質が変わる。)</p> <p>(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。</p>   |      |    |    |           |
| <b>製造販売元</b>        | <p>帝國製薬株式会社</p> <p>香川県東かがわ市三本松567番地</p>   |      |    |    |           |
| <b>お問い合わせ先</b>      | <p>帝國製薬株式会社 お客様相談室</p> <p>TEL 0879-25-2363 受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)</p>   |      |    |    |           |