医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

| 1 | 名称 | 小粒タウロミン | | |
|-----|---------------|---|------|---------|
| | 成分・分量 | 36 錠中 | | |
| 2 | | サイコ末 90mg、ハマボウフウ末 90mg、センキュウ末 90mg、ブクリョウ末 90mg、 | | |
| | | オウヒ末 90mg、キキョウ末 90mg、ショウキョウ末 90mg、ドクカツ末 54mg、ケイガイ | | |
| | | 末 54mg、カンゾウ末 54mg、リン酸水素カルシウム 1080mg、乳酸カルシウム | | |
| | | 360mg、ヨクイニン末 360mg、アミノエチルスルホン酸(タウリン)36mg、グルクロノラク | | |
| | | トン 36mg、チアミン硝化物(ビタミン B₁) 7.2mg、リボフラビン(ビタミン B₂) 7.2mg、ピ | | |
| | | リドキシン塩酸塩(ビタミン B ₆) 3.6mg、ニコチン酸アミド 14.4mg、パントテン酸カルシ | | |
| | | ウム 14.4mg、イノシトール 18mg、エルゴカルシフェロール(ビタミン D ₂) 9μg(360 | | |
| | | 国際単位)、クロルフェニラミンマレイン酸塩 3.6mg | | |
| | 用法·用量 | 次の量を水又は温湯で服用してください。症状により通常量の 2~3 倍服用すること | | |
| 3 | | もできます。 | | |
| | | 年 齢 | 1 回量 | 1 日服用回数 |
| | | 成人(15 歳以上) | 12 錠 | 3 回 |
| | | 8 歳以上 15 歳未満 | 6 錠 | |
| | | 5 歳以上 8 歳未満 | 4 錠 | |
| | | 3 歳以上 5 歳未満 | 2 錠 | |
| | | 3 歳未満の幼児 服用しないこと | | |
| 4 | | 湿疹、皮膚炎、じんま疹、皮膚のかゆみ、鼻炎 | | |
| · · | 793116 79321 | 1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください | | |
| 5 | 保健衛生上の | 他のアレルギー用薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(かぜ薬、鎮咳去痰薬、 | | |
| | | 過のプレルマー | | |
| | | 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください | | |
| | | | | |
| | 危害を防止 | | | |
| | するために | 次に該当する人はお申し出ください | | |
| | 必要な事項 | | | |
| | | | | |
| | | ・薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。 | | |
| | | ・次の症状のある人。排尿困難 | | |
| | | ・次の診断を受けた人。緑内 | 内障 | |
| 6 | | | | |
| | 数がはまれて | | | |
| | 薬剤師または | | | |
| | 登録販売者が | | | |
| | 必要と判断 する事項 | | | |
| | ッの事項 | | | |
| | | | | |

〔注意事項〕

- 1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
- 2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
- 3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。