

バンテリン^{コーウ}パップホット

△使用上の注意

■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は使用しないでください

(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)15歳未満の小児。

2.次の部位には使用しないでください

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。(3)みずむし・たむし等又は化膿している患部。

3.連続して2週間以上使用しないでください

■相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、痛み、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■成分・分量(膏体100g中)

インドメタシン0.5g[添加物]カオリン、酸化チタン、ゼラチン、ヒマシ油、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポリアクリル酸部分中和物、尿素、カルメロースNa、メタリン酸Na、プロピレングリコール、D-ソルビトール、ジヒドロキシアルミニウム アミノアセテート、エデト酸Na、ポリソルベート80、酒石酸、l-メントール、アジピン酸ジイソプロピル、マクロゴール、香料、トウガラシエキス

■効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター
TEL03-3279-7755 月~金(祝日を除く)9:00~17:00

副作用被害救済制度
0120-149-931

(1枚14cm×10cm) 保湿チャック付き(パッケージの乾燥を防ぎます。)

この外箱は、使用の際にはよく読み、大切に保管してください。

■用法・用量

ライナー(プラスチックフィルム)をはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

<用法・用量に関する注意>

(1)用法・用量を厳守してください。(2)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。(3)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとつから使用してください。(4)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

<その他の注意>

本剤には、添加物としてトウガラシエキスが配合されていますので、以下のことについて注意してください。(1)打撲・捻挫等に使用する場合には、患部の熱感等の症状がおさまってから使用してください。(2)本剤を使用後、汗をかくと刺激を感じことがあります。(3)本剤に触れた手で、眼、鼻腔、口腔等の粘膜に触れないように注意してください。(4)本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。(5)本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴すると刺激を感じことがありますので、入浴の1時間以上前に、はがしてください。また、入浴後は30分程してから使用してください。

上手な貼り方

- ① 片方のフィルムをはがしてください。



- ② 粘着面を患部に貼り、残りのフィルムをはがしながら貼ってください。



■保管及び取扱い上の注意

(1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4)品質保持のため、開封後の未使用分は薬袋に入れ、開口部のチャックをきちんとしめて密封し、保管してください。(5)使用期限(外箱及び薬袋に記載)をすぎた製品は使用しないでください。

製造販売元 興和株式会社 〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

Languages

English

简体字

繁體字

한국어

<http://hc.kowa.co.jp/otc/tenpu>

