

使用に際して、この説明書きを必ず読むこと。また必要なときに読めるよう大切に保管すること

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない
湿気の少ない涼しい所(冷暗所)にキャップをしっかりとし
めて箱に入れて立てて保管する
(2)火気に近づかない
(3)小児の手の届かない所
に保管する
(4)他の容器に入れ替えない(誤用の原因
になつたり品質が変わる)
(5)使用期限をすぎた製品
は使用しない。なお、使用期
限内であつても、開封後はなるべく速やかに使用する

●キャップをしっかりとしめないと液がもれことがある
●衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に従つて、すみやかに洗う

製品のお問合せは、お買い求め
のお店又はお客様相談室にお願
いいたします

外用鎮痛
消炎剤

押して
開ける

第2類
医薬品

販売名:アンマルツゴールドEX NEO
External Anti-Inflammatory/Antalgic

△使用上の注意

× してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起つりやすくなる)

1. 次の人は使用しない

- (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2)ぜんそくを起こしたことがある人
- (3)妊娠又は妊娠していると思われる人
- (4)15才未満の小児

2. 次の部位には使用しない

- (1)目の周囲、粘膜等
- (2)皮ふの弱い部位(顔、頭、わきの下等)
- (3)湿疹、かぶれ、傷口
- (4)みずむし・たむし等又は化膿している患部

3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しない

4. 長期連用しない



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談する

- (1)医師の治療を受けている人
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3)次の医薬品の投与を受けている人
ニューキノロン系抗菌剤

2. 使用中又は使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談する

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹、発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮ふのあれ、落屑(フケ、アカ)のような皮ふのはがれ、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがある
その場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、どののかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
接触皮ふ 炎、光線 過敏症	塗布部に強いかゆみを伴う発疹、発赤、はれ、刺激感、水疱・だばれ等の激しい皮炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身にひろがることがある。また、日光があつた部位に症状があらわれたり、悪化することがある

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談する

特 徴

- ①ジクロフェナクが患部に浸透、痛みを鎮める
- ②3種の血行促進成分がジンジン温かな実感とともに、滞った患部の血流を改善
- ③L-メントール5%配合、爽快な使い心地

- [成分・量] 100g中 -

ジクロフェナクナトリウム 1g
L-メントール 5g
トコフェロール酢酸エステル 100mg
ノナン酸パニリルアミド 12mg
ニコチン酸ベンジルエステル 10mg
添加物として、グリチルレチン酸、
ミリストン酸ソルビロイル、プロピレンジグリコール、ラウロイルアミド、
ココラ、乳酸、エタノールを含む

- [用法・用量] -

1日3~4回、適量を患部に塗布する。ただし、塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わない。なお、本成分を含む他の外用剤を併用しない

<用法・用量に関する注意>

- (1)定められた用法・用量を厳守する
- (2)本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用する(3)本剤は外用にのみ使用し、内服しない(4)1週間あたり50gを超えて使用しない(5)目に入らないように注意する。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うなお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受ける(6)使用部位に他の外用剤を併用しない(7)通気性の悪いもの(ラップフィルム、矯正ベルト等)で使用部位を覆い、密封状態にしない
- 皮ふの特に弱い方は、同じ所に続けて使用しない
- スポーツや入浴等、汗をかく前後に使用した場合、ヒリヒリとした刺激、痛みや熱感が増すことがありますこれららの症状が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

＼あつたらいいな／をカタチにする
発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10
小林製薬 お客様相談室
0120-5884-01
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

税控除対象

MADE IN JAPAN

火気厳禁 第一石油類 危険等級II
エタノール含有物

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931