

かぜのひきはじめ
に効く漢方薬成分の

か っ こ ん と う

葛根湯

熱・のどの痛み
せきに効く

そ う ご う

ぐ す り


総合かぜ薬

成分を

ひとつにしたかぜ薬

ココト 顆粒

ふたつのかぜ薬成分でかぜに効く



ビタミンC

ビタミンB₂配合

第②類**医薬品**

第②類**医薬品**

開け口

コフト® 顆粒

特長

1. **かぜのひきはじめに効く漢方薬成分の葛根湯と熱・のどの痛み・せきに効く総合かぜ薬成分をひとつにした顆粒のかぜ薬です**
2. 漢方薬の葛根湯と総合かぜ薬のふたつのかぜ薬成分の作用で、かぜに効きます
3. 配合の総合かぜ薬は頭痛・鼻水・鼻づまり・くしゃみ・関節の痛み等といった、かぜの諸症状に効きます
4. 12歳以上のお子様から大人まで服用できます
5. レモン25個分のビタミンC・ビタミンB₂配合

効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

用法・用量

15歳以上の**成人1回1包**、12歳以上15歳未満1回2/3包、いずれも**1日3回**、食後なるべく30分以内に、水と一緒に服用して下さい 12歳未満は服用しないで下さい
残った顆粒を保管する場合、顆粒がこぼれ出ないようにアルミ袋の開け口を3重に折り曲げ、2日以内に服用して下さい

用法及び用量に関連する注意

(1) 用法・用量を厳守して下さい (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい

ご使用に際して、この箱の説明文書を必ずお読み下さい
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい

副作用被害救済制度 ☎0120・149・931

販売 **日本臓器製薬株式会社**
大阪府中央区平野町2-1-2

製造 **新生薬品工業株式会社**
販売元 奈良県高市郡高取町清水谷1269

お客様相談窓口 ☎06・6222・0441 受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

®登録商標

成分 3包中

漢方薬葛根湯の生薬成分と作用 葛根湯エキス2,200mg中 カッコン…3.83g
マオウ…1.91g タイソウ…1.91g ケイヒ…1.43g シャクヤク…1.43g カン
ゾウ…0.96g ショウキョウ…0.48g 7種類の生薬成分が、かぜのひきはじめに
効果を発揮します

総合かぜ薬の成分と作用 アセトアミノフェン…450mg 熱を下げ、のどの痛
み・頭痛を治します クロルフェニラミンマレイン酸塩…7.5mg 鼻水・鼻づま
り・くしゃみを抑えます ジヒドロコデインリン酸塩…24mg せき中枢に働きせ
きを止めます ビタミンC…500mg レモン25個分のビタミンCを含みます ビ
タミンB₂…4mg 卵・牛乳に含まれる栄養成分です グアイフェネシン…250mg
たんを出しやすくします 無水カフェイン…90mg のどの痛み・頭痛を治す作用
を高める効果があります

添加物 乳糖水和物・ヒドロキシプロピルセルロース・スクラロース・香料

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に
保管して下さい (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい (3) 誤用の原因
になったり品質が変わることがありますので、他の容器に入れ替えないで下
さい (4) 使用期限を過ぎた商品は服用しないで下さい

⚠️使用上の注意

❌**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用して喘息を起こしたことがある人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等 (鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等)
3. 服用後、眠気等があらわれることがありますので、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけて下さい
5. 服用前後は飲酒しないで下さい
6. 長期連用しないで下さい

相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 高熱、排尿困難の症状のある人 (6) 甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症の診断を受けた人

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

【右側面に続きが記載されています】

相談すること の続き

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります
その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、 声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息 苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン 症候群)、 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のた だれ、のどの痛み、皮ふの広範囲 の発疹・発赤、赤くなった皮ふ上 に小さなブツブツ(小膿疱)が出 る、全身がだるい、食欲がない等 が持続したり、急激に悪化する
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮ふや白目が黄 色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不 振等があらわれる
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、 全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢 等があらわれる
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると 息切れがする・息苦しくなる、空せき、発 熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、 持続したりする
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴 る、息苦しい等があらわれる
再生不良性 貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふ や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息 切れ、気分が悪くなりクラツとする、血尿 等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる
呼吸抑制	息切れ、息苦しさ等があらわれる

3. 服用後、便秘、口のかわき、眠気があらわれること
があるので、このような症状の持続又は増強が見
られた場合には、服用を中止し、この箱を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用
を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録
販売者に相談して下さい