

服用前にこの説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

のどの炎症による のどの痛み・イガイガ、せきに

# VICKS メディカル トローチ

販売名: ヴィックス メディカル トローチ 第2類医薬品 〈鎮咳去痰薬〉

- ◆ ヴィックス メディカル トローチは、殺菌・消毒作用のあるセチルピリジニウム塩化物水和物、せきを鎮めるdl-メチルエフェドリン塩酸塩、たんを出しやすくするグアヤコールスルホン酸カリウムを配合した鎮咳去痰薬です。
- ◆ のどの炎症によるのどの痛みやのどのイガイガ、せきなどの症状に優れた効果を発揮します。
- ◆ 服用しやすい、抹茶風味のトローチ剤です。



## 使用上の注意



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください  
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬



## 相談すること



### 1 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) 次の症状のある人。

高熱

- (7) 次の診断を受けた人。  
心臓病、高血圧、糖尿病、甲状腺機能障害

### 2 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位  | 症状          |
|-------|-------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい         |

### 3 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効 能

せき、喘鳴(ぜーぜー、ひゅーひゅー)をともなうせき、たん、のどの炎症による声がれ・  
のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ



## 用法・用量

次の量を2時間以上の間隔をおいて、口中  
に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。

| 年 令  | 1回量     | 服用回数 |
|------|---------|------|
| 8才以上 | 1錠      | 1日6回 |
| 8才未満 | 服用しないこと |      |

### 【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3)かみくだいたり、のみこんだりしないでください。
- (4)錠剤の取り出し方  
図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し、裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)



## 成 分

1錠中

| 成 分             | 分 量    | はたらき                       |
|-----------------|--------|----------------------------|
| セチルピリジニウム塩化物水和物 | 1mg    | のどを殺菌・消毒します。               |
| dl-メチルエフェドリン塩酸塩 | 6.25mg | 気管支を広げ、呼吸を楽にして、せきを鎮めます。    |
| グアヤコールスルホン酸カリウム | 22.5mg | のどにからんだたんをやわらかくして出しやすくします。 |

添加物：トウモロコシデンプン、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、還元麦芽糖水アメ、ステアリン酸Mg、トメントール、アセスルファミンK、スクラロース、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、三酸化鉄、青色1号、香料、バニリン、フェノール

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後は6ヵ月以内に服用してください。(品質保持のため)



この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
又は下記にお願い申し上げます。

連絡先 大正製薬株式会社 お客様119番室  
電 話 03-3985-1800  
受付時間 8:30~17:00(土、日、祝日を除く)  
※受付時間は、大正製薬ホームページにてご確認ください



大正製薬株式会社  
東京都豊島区高田3丁目24番1号  
<https://brand.taisho.co.jp/vicks/>

## 副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 [https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)