

第2類医薬品

120錠

プラセントップ錠

Ⓢ 特許商標

OCF-13GS

プラセンタ製剤

第2類医薬品

プラセンタ製剤

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhlgai.html>

電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせ先

スノーデン株式会社

お客様相談室 電話 03-3866-2459

受付時間 8:50~12:00、13:00~17:30

(土・日・祝は除く)

製造番号

使用期限

プラセンタエキス、ビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>6</sub>・B<sub>12</sub>配合

プラセントップ錠

プラセントップ錠

120錠

《滋養強壮剤》 PLACEN-TOP TABLETS

120錠

製造販売元



スノーデン株式会社 東京都千代田区岩本町3-7-16

第2類医薬品

第2類医薬品

プラセントップ錠

この箱は本剤とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

△使用上の注意 【相談すること】

- 1. 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある方は、購入時に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- 2. 服用後、皮ふに発疹又は消化器に軟便・便秘等の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
- 3. しばらく服用しても症状の改善がみられない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【成分・分量】 6錠(成人1日量)中  
 絨毛組織加水分解物 ..... 600.0mg  
 (プラセンタエキスとして2,000mg)  
 テアミン硝化物(ビタミンB<sub>1</sub>硝酸塩) ..... 6.0mg  
 ビリドキシン塩酸塩(ビタミンB<sub>6</sub>) ..... 6.0mg  
 シアノコバラミン(ビタミンB<sub>12</sub>) ..... 60µg  
 \*添加物として、乳糖水和物、セルロース、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、カルナウバロウ、黄色4号(タートラジン)、黄色5号を含有します。

【効能・効果】○滋養強壮○虚弱体質○肉体的疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】次の1回量を1日3回服用します。

年齢	成人(15歳以上)	6歳~14歳	8歳未満
1回量	2錠	1錠	服用しないでください

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 錠剤の取り出し方  
錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



HP1TD1A

